

# **A kemo- és radioterápia hatása a fej-nyak daganatos betegek szájüregi státuszára**

**Előadó:** Burai Fanni

**Szerzők:** Stájer Anette

**Intézmény:** SZTE-FOK, Fogpótlástani Tanszék, 6720 Szeged

Az összes diagnosztizált ajak- és szájüregi daganatos megbetegedések tekintetében a világon a hozzáférhető 2020-as felmérés azt mutatja, hogy Európában fordul elő az összes elváltozás közel negyede (22,8%), a mortalitást tekintetében ez az érték 19,6%. Sajnos Magyarország az elmúlt évtizedek alatt megtartotta vezető szerepét Európában a fej-nyaki daganatos megbetegedések előfordulásában, első helyen áll a szájüregi daganatok morbiditása és mortalitása terén is a régióban. A betegek több, mint felénél a felfedezett rosszindulatú elváltozás helyileg már előrehaladott stádiumban van, 10 %-uk ad már távoli áttétet. Az érintett páciensek végleges arcdeformitástól, az esztétikai elváltozások mellett különböző funkciók csökkenésétől, megszűnésétől szenvedhetnek, esetükben nehezített lehet a beszéd, a rágás és a nyelés. A daganatterápiában kizárólag a sebészi terápia ritka, többnyire kombinált ellátás történik, a műtétet követően sugár-, vagy kemoterápiát kapnak betegeink. Ezek a kezelések többféle mellékhatással járhatnak, melyek a páciens életminőségét nagyban ronthatják és az elkészítendő fogpótlás fajtájára és minőségére befolyással lehetnek. Sokszor kihívást jelent a gyakorló fogorvos számára a megtanult ismeretek alkalmazása, nem minden esetben lehet kompromisszumok nélkül részükre fogpótlást készíteni.

Vizsgálataink a műtéti és az adjuváns terápia negatív szájüregi és fogazati hatására irányul, emellett információt gyűjtünk a protetikai rehabilitációnk sikerességéről is. A folyamat során a korábban rehabilitált betegeinket ellenőrizzük, az onkológiai kezelések esetleges rövid-és hosszútávú következményének felmérése céljából. A leletek összegyűjtése és kiértékelése segítheti a jövőbeli munkánkat.